

ROSA CLINOPHYLLA.

R. (1) Germinibus globosis, caule pedunculisque sericeo-villosis; petiolis glandulosis villosis subaculeatis; stipulis fimbriatis; foliolis 9 - 11, oblongo-ellipticis duplicato-serratis, supra lucidis subtus tomentosis; aculeis caulinis rectis geminatis. (N.)

ROSIER A FEUILLES PENCHÉES.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau, lisse, sarmenteux, ne paraît pas s'élever à plus de trois ou quatre pieds. Ses tiges, couvertes d'un duvet court, serré, blanchâtre, soyeux, sont armées çà-et-là, mais sur-tout à la base des stipules des feuilles, d'aiguillons fins, droits et géminés. Ses feuilles sont alternes, et penchées d'une manière très-remarquable. Les folioles, au nombre de neuf, souvent de onze, elliptiques, presque toujours doublement dentées, d'un vert gai, luisantes en-dessus, tomenteuses en-dessous, sont supportées par des pétioles velus, glanduleux, quelquefois munis de deux ou trois aiguillons petits et crochus. Les stipules sont frangées, à divisions

(1) CAULIS fruticosus sericeo-villosus. RAMI teretes villosi. ACULEI stipulares duo. Folia alterna, pinnata, propendentia. Foliola opposita, subsessilia oblongo-elliptica duplicato-serrata, supra lucida, subtus villosa. Petioli glandulosi, villosi, subaculeati, aculeis, 2, 3, recurvis, minimis. Stipulae lineares, fimbriatæ, acuminatæ. PEDUNCULI sæpius solitarii, aliquando gemini, etiam terni, brevissimi, villosi. Germen globosum, villosum, foliis floralibus alternis bracteisque nonnunquam subobsitum. Lobi Calicis indivisi, acuminati, sericeo-villosi. Petala 5, alba, obcordata, basi flavescentia. Fructus subglobosus. Maturum non vidi. (N.)